

TÁJÉKOZTATÓ GYOMORTÜKRÖZÉSHEZ

Az esetleges szövődmények elkerülése érdekében **kezelőorvosát és altatóorvosát mindenképpen tájékoztassa**, ha [gyógyszerérzékenysége van, véralvadásgátlót szed, epilepsziás, zöldhályogja, szívritmusszabályzója van, terhes, vagy egyéb említést igénylő betegsége](#) van!

1. Az eljárás célja:

A nyelőcső-gyomor-nyombél betegségeinek időben történő felismerése, szövettani mintavétel, gyógykezelés elvégzése (pl. polipektómia, idegtest eltávolítás, vérzéscsillapítás)

2. Az eljárás technikája:

Éhgyomorral, a garat helyi érzéstelenítése után, vagy - a beteg kérésére történő - altatás mellett, egy **hajlékony műszer** (endoszkóp-optikai és munkacsatornákkal) **levezetése** történik a szájon át a nyelőcsőn, gyomron keresztül a nyombélbe. Az orvosa alaposan át tudja tekinteni a vizsgált szakaszokat, szükség esetén az indokolt beavatkozásokat is elvégzi.

A vizsgálat kellemetlenségeinek elkerülése céljából - a páciens kérésére - a vizsgálatot **altatás mellett is végezzük**.

A körülményektől függően **a vizsgálat kb. 5-15 percig tart**.

A vizsgálat után puffadás érzése természetes. Ha a vizsgálat altatásban történt, **minimum 30 perces megfigyelést** végzünk ébredő helyiségünkben szakasszisztenseink által. Ezt követően – ha az altató orvos jóváhagyja - **kísérővel távozhatsz otthonába**, mivel járművet aznap nem vezethet. Bármely utópanasz esetén forduljon bizalommal vizsgáló orvosához!

3. Az eljárás esetleges veszélyei, következményei lehetnek:

- A vizsgálat során éber állapotban erőltetett köhögés, hányinger
- Ritkán az érzéstelenítő vagy nyugtató injekció iránti túlérzékenység
- A beavatkozás vérzéssel járhat.
- A tükrözés során ritkán fellépő szövődmény (tápcsatorna sérülése, kilyukadás) miatt – 10.000 vizsgálatra átlagosan egy esetben sürgős műtét válhat szükségessé.

4. Ezen eljárás elmaradásának esetleges veszélyei:

Klinikai kezelés szempontjából fontos kórképek felismerésének elmaradása: fekélyes elváltozások, gyulladás, polipok, daganatok, daganatok kialakulása (el nem távolított polipok), tápcsatornai vérzés esetén vérzéscsillapító kezelés elmaradása (vérvettség).

5. A beavatkozás utáni időszak teendői:

Garatérzéstelenítés esetén a vizsgálat után 1 óráig nem étkezhet!

Bódításban végzett gyomortükrözés után nem szabad gépjárművet vezetni, veszélyes, vagy megerőltető munkát végezni. Beavatkozással kísért (pl. mintavétel, polip eltávolítás) tükrözés után csak orvosa utasítása szerinti módon lehet újra étkezni. Polip levételt és/vagy mintavételt követően előfordulhat kisebb mennyiségű vér a székletben.

[Erősödő vérzés, valamint láz és gyomortáji, hasi fájdalom esetén mindenképpen keresse fel kezelőorvosát!](#)